

Cuando está indicada, debe realizarse en forma temprana (de preferencia, antes del día 11 de la intubación orotraqueal) para evitar complicaciones por lesión traqueal derivadas de intubación orotraqueal prolongada.<sup>6</sup>

El procedimiento debe realizarse en quirófano, o al menos en una Unidad de Terapia Intensiva, para evitar problemas<sup>7</sup>.

#### **Bibliografía**

1. <http://www.encyclopediasalud.com/definiciones/traquea><sup>1</sup>
2. <https://www.lifeder.com/traquea-funciones-estructura><sup>2</sup>
3. <http://www.encyclopediasalud.com/definiciones/traqueostomia><sup>3</sup>
4. [https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/noticias\\_archivos/74/documentos/74\\_traqueostomiaFinal1.pdf](https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/noticias_archivos/74/documentos/74_traqueostomiaFinal1.pdf)<sup>4</sup>
5. [https://www.news-medical.net/health/Tracheotomy-Complications-\(Spanish\).aspx](https://www.news-medical.net/health/Tracheotomy-Complications-(Spanish).aspx)<sup>5</sup>
6. <http://www.hpc.org.ar/images/revista/623-r17n1p18.pdf><sup>6</sup>
7. Gómez M, López C, Villalba MV, Muiño A. Reanimación cardiopulmonar. Soporte vital básico y avanzado<sup>7</sup>.
8. Actualización. Medicine [revista en Internet. 2015 [acceso el 21 de noviembre de 2016]; 11(87):5185-94<sup>8</sup>