

Bibliografía

1. Torre Alonso JC. Concepto, clasificación y metrología. Manual SER de enfermedades reumáticas. 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. pp. 251-260
2. Collantes Estévez E. Espondilitis Anquilosante. Manual SER de enfermedades reumáticas. 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. pp. 261-269
3. van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. *Arthritis Rheum.* 1984 Apr;27(4):361-8.
4. Veroz Gonzalez R, Collantes Estévez E. Evaluación de las recomendaciones ASAS-EULAR para el tratamiento de la espondilitis anquilosante. *Reumatol Clin* 2007;3 Supl 2:S39-43
5. Castro Villegas MC, Batlle Gualda E. Metrología en espondiloartritis. *Reumatol Clin.* 2010;6(S1):11-17
6. Zarco P. Cómo evaluar a los pacientes con espondilitis en la práctica clínica diaria. *Reumatol Clin.* 2005;1 Supl 1: S16-20
7. González Naranjo LA, Londoño JD, Valle RR. Diagnóstico temprano de las espondiloartropatías. *Revista colombiana de reumatología* Vol. 12 No. 3, Septiembre 2005, pp. 241-262
8. Villaverde-García V, Cobo-Ibáñez T, Candelas-Rodríguez G, Seoane-Mato D, Díaz del Campo-Fontecha P, Guerra M, Muñoz-Fernández S, Cañete JD. The effect of smoking on clinical and structural damage in patients with axial spondyloarthritis: A systematic literature review. *Seminars in Arthritis and Rheumatism* 46 (2017) 569-583.
9. Gratacós Masmitjà J. Terapéutica: Terapias biológicas en espondiloartritis: ¿cuándo y cómo? *Reumatol Clin* 2007;3 Supl E2:55-9 - Vol. 3
10. Fagerli KM, Lie E, van der Heijde D, Heiberg MS, Kaufmann C, Rødevand E, Mikkelsen K, Kalstad S, Kvien TK. Selecting patients with ankylosing spondylitis for TNF inhibitor therapy: comparison of ASDAS and BASDAI eligibility criteria. *Rheumatology (Oxford).* 2012 Aug;51(8):1479-83.
11. Vastesaeger N, Vander Cruyssen B, Mulero J, Gratacós Masmitjà J, Zarco P, Almodovar R, Font P, Juanola X, Collantes-Estevez E. Actividad elevada ASDAS versus elevación de BASDAI en pacientes con espondilitis anquilosante como criterio de selección para el tratamiento con anti TNF-alfa. *Reumatol Clin* 2014;10:204-9 - Vol. 10 Núm.4
12. Abalos-Medina GM, Ruíz-Villaverde G, Sánchez-Cano D, Ruíz-Villaverde R, Ocaña-Peinado F, Villaverde-Gutiérrez C. Nivel funcional y calidad de vida en espondilitis anquilosante. Estudio piloto tras 16 semanas de tratamiento anti-TNF. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2010;45(6):331-334